

**PROVA PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL – GINECOLOGIA  
VARGEM GRANDE PAULISTA 23/04/2018**

Nome completo: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

1) Mulher de 39 anos compareceu ao serviço de saúde com queixas de dor genital durante a relação sexual. Relatou que, embora a dor seja mais frequente durante o ato sexual, às vezes, ocorre após o intercurso da relação sexual. Qual é o nome dado a esse quadro?

- a) Parafilia
- b) Dispareunia
- c) Vaginismo
- d) Anorgasmia

2) Os dois mais importantes micro-organismos sexualmente transmissíveis, associados à doença inflamatória pélvica, são

a) *Candidaalbicans* e *Mycoplasmagenitalium*.

---

b) *Mycoplasmagenitalium* e *NeisseriaGonorrhoeae*.

c) *Chlamydiatrachomatis* e *Neisseriagonorrhoeae*.

d) *Gardnerellavaginalis* e *Neisseriagonorroae*.

3) Assinale, a seguir, um critério clínico de certeza de gravidez.

A. Puzos.

B. Nobile-Budin.

C. Rede de Haller.

D. Regra de Goodel.

4) Cerca de 5 a 10% das mulheres na menacme têm o diagnóstico de Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP). O diagnóstico dessa doença é de exclusão; portanto, para fazê-lo é preciso excluir outras doenças que podem cursar com

sintomas semelhantes. Entre os marcadores séricos relacionados, NÃO deve ser solicitado com esse objetivo:

- A.** TSH.
- B.** SHBG.
- C.** Prolactina.
- D.** 17-OH-progesterona.

5) Um dos diagnósticos diferenciais de amenorreia na menacme é a síndrome de Kallman. Sabe-se que essa doença é caracterizada por uma tríade. Assinale, a seguir, a alternativa que apresenta um componente dessa tríade.

- A.** Surdez.
- B.** Anosmia.
- C.** Mutismo.
- D.** Cegueira noturna.

6) ADR, 17 anos, comparece à consulta com queixa de dispareunia, prurido vaginal e corrimento esbranquiçado com odor fétido há duas semanas. À colposcopia, observa-se colo em framboesa e aspecto tigróide à análise pelo teste de Schiller. O provável causador dessa afecção é um(a):

- A.** Fungo.
- B.** Protozoário unicelular.
- C.** Bactéria Gram-negativa intracelular.
- D.** Bactéria Gram-negativa extracelular.

7) A ovulação ocorre \_\_\_\_\_ após o início do aumento de LH. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.

- A.** 12 horas
- B.** 14 dias
- C.** 24 horas
- D.** 36 horas

8) São contraindicações para uso de terapia de reposição hormonal em mulheres após menopausa, EXCETO:

- A.** Doenças hepáticas ativas.
- B.** Histórico de câncer de ovário.
- C.** Histórico de câncer de endométrio.
- D.** Tromboembolismo pulmonar prévio.

9) Os ligamentos \_\_\_\_\_ fazem a sustentação anterior do útero.

Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.

- A.** cardinais
- B.** paramétrios
- C.** uterossacros
- D.** pubovesicouterinos

10) A prenhez ectópica, também denominada prenhez extrauterina, é definida como a implantação do óvulo fertilizado em qualquer lugar diferente de sua localização endometrial dentro da cavidade uterina. Ocorre mais comumente nas tubas uterinas, sendo mais comum no(a):

- A.** Istmo.
- B.** Fímbria.
- C.** Ampola.
- D.** Interstício

11) Sobre a endometriose, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A.** Sua localização mais comum é no ovário.
- B.** A pílula anticoncepcional combinada é uma boa opção de tratamento.
- C.** Há correlação direta entre a extensão das lesões e a intensidade da dor.
- D.** A ressonância magnética pode diagnosticar a doença; entretanto, um resultado normal não descarta a presença de endometriose.

12) O dado, mais significativo na predição do parto prematuro é:

- A.** fibronectina fetal

- B.** vaginose bacteriana
- C.** história pregressa de parto prematuro
- D.** ultrassonografia transvaginal para medida cervical

13) É causa de puberdade precoce central:

- A.** hamartoma
- B.** gonadoblastoma
- C.** tumor de células de Leydig
- D.** síndrome de McCune-Albright

14) Paciente de 32 anos de idade, sem quaisquer comorbidades, apresenta ASCUS como resultado colpocitológico. Após consulta rotineira ginecológica, deve ser orientada a:

- A.** realizar colposcopia
- B.** realizar biopsia cervical
- C.** repetir o exame em 1 ano
- D.** repetir o exame em 6 meses

15) A medicação mais eficaz no controle da endometriose se constitui em:

- A.** dienogeste
- B.** pílula de progesterona
- C.** anticoncepcionais orais combinados
- D.** sistema intrauterino com progestágeno

16) Paciente 35 anos, nuligesta, em consulta ginecológica rotineira, refere fumar um maço de cigarros ao dia há 20 anos e pergunta sobre métodos contraceptivos. A melhor indicação é:

- A.** adesivo combinado
- B.** pílula de progestágeno
- C.** anel vaginal combinado
- D.** anticoncepcionais combinados

17) O conceito de menorragia corresponde a:

- A. sangramento intermenstrual
- B. menstruação cíclica prolongada ou intensa
- C. ciclos menstruais com intervalos acima de 35 dias
- D. ciclos menstruais com intervalos acima de 35 dias

18) O útero didelfo corresponde à ausência de:

- A. fusão dos ductos de Wolf
- B. fusão dos ductos de Müller
- C. desenvolvimento do seio urogenital
- D. desenvolvimento dos ductos paramesonéfricos

19) Durante a gestação, a alternativa terapêutica ao tratamento da sífilis latente tardia é

- A. Ceftriaxona.
- B. Ciprofloxacina.
- C. Doxicilina.
- D. Eritromicina.
- E. Penicilina G Cristalina.

20) Considera-se uma indicação para a antecipação do parto, na pré-eclâmpsia leve,

- A. uso de anti-hipertensivo oral.
- B. oligodrâmio discreto.
- C. multiparidade.
- D. idade gestacional de 37 semanas.
- E. histórico de pré-eclâmpsia grave.